


НАРУШЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ

- Может не проявлять интерес к играм других детей



- Может всячески сопротивляться, когда родители держат его на руках, обнимают или целуют



- Может быть жесток с родными



КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- Не осознает, что происходит в окружающей обстановке



- Избегает ВИЗУАЛЬНОГО КОНТАКТА



- Направляет руку взрослого




СТЕРЕОТИПНОЕ / ПОВТОРЯЮЩЕЕСЯ ПОВЕДЕНИЕ

- Вращение вокруг себя



- Машут руками



- Выстраивание в ряд (напр. машинок)




- Ест несъедобное, например одежду, матрас, шторы



НАРУШЕНИЯ МОТОРИКИ

- Плохая координация




- Ходьба на цыпочках



- Проблемы мелкой моторики



- Дефицит глубинного пространственного восприятия



СЕНСОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ

- Не дает стричься



- С трудом переносит музыку и громкие звуки



- Вращает объекты очень близко к лицу



САМОПОВРЕЖДЕНИЯ (АУТОАГРЕССИЯ)

- Кусает себя, не выказывая явных признаков боли



- Отсутствует осознание опасности



- Счесывает или расцарапывает кожу



- Выдергивает пучки волос



НАРУШЕНИЯ СНА/ НАРУШЕННАЯ РЕАКЦИЯ НА БОЛЬ / СУДОРОГИ

Нарушения сна:

- Дети могут несколько дней бодрствовать, не выказывая потребности во сне. Могут не отличать день от ночи. Могут с трудом засыпать и постоянно просыпаться.
- Могут спать лишь непродолжительное время, в течение одного-двух часов



- Нарушена реакция на восприятие боли
- Низкий / отсутствующий болевой порог или высокий болевой порог



- Судороги/Патология, сопутствующая судорогам, увеличивается с возрастом. Этиология неизвестна



- Если у вашего ребенка проявляется 1 или 2 или более нарушений описанных выше, то следует обратиться к педиатру.



- Эти симптомы служат сигналом для проведения углубленной диагностики ребенка.

